

✓ کارنیل، بزرگترین شبکه موفقیت ایرانیان می باشد، که افرادی زیادی توانسته اند با آن به موفقیت برسند، فاطمه رتبه ۱۱ کنکور کارشناسی، محمد حسین رتبه ۶۸ کنکور کارشناسی، سپیده رتبه ۳ کنکور ارشد، مریم و همسرش راه اندازی تولیدی مانتو، امیر راه اندازی فروشگاه اینترنتی، کیوان پیوستن به تیم تراکتور سازی تبریز، میلاد پیوستن به تیم صبا، مهسا تحصیل در ایتالیا، و..... این موارد گوشه از افرادی بودند که با کارنیل به موفقیت رسیده اند، شما هم می توانید موفقیت خود را با کارنیل شروع کنید.

برای پیوستن به تیم کارنیلی های موفق روی لینک زیر کلیک کنید.

www.karnil.com

همچنین برای ورود به کanal تلگرام کارنیل روی لینک زیر کلیک کنید.

<https://telegram.me/karnil>

Contents

۳.....	۱.۱ مقدمه
۳.....	۱.۲ کار کبد چیست؟
۴.....	۱.۳ اتفاقاتی که هنگام نوشیدن الكل در کبد می افتد؟
۵.....	۱.۴ مشکلات ناشی از نوشیدن بیش از حد الكل
۶.....	۱.۴.۱ کبد چرب
۹.....	۱.۴.۲ ناراحتی معده
۹.....	۱.۴.۳ مشکلات روحی
۹.....	۱.۴.۴ فشارخون و بیماری قلبی
۱۰.....	۱.۴.۵ چاقی
۱۰.....	۱.۵ انواع بیماری‌های کبدی
۱۱.....	۱.۵.۱ کبد چرب
۱۱.....	۱.۵.۲ هپاتیت الكلی
۱۱.....	۱.۵.۳ سیروز کبدی
۱۲.....	۱.۶ راههای درمان برای بیماری‌های الكلی کبد
۱۲.....	۱.۷ پیشگیری از بیماری کبدی الكلی
۱۴.....	۱.۸ پاورقی
۱۵.....	۱.۹ مراجع

www.watchmovie.blogfa.com

م.سیاوش

صرف الکل و کنترل

بیماری‌های مربوط به آن

۱.۱ مقدمه


از آنجای که در ایران این مسئله مانند سایر مسائل از این دست به کل از طرف دولت و جامعه پزشکان کتمان می‌شود لذا آگاهی کاملی نیز در این مورد به مصرف کنندگان ان نیز داده نمی‌شود و گاهها با دادن اطلاعات کلی تنها سعی در ترساندن افراد مصرف کننده دارند البته قبل از رسیدگی به این مطلب باید بگوییم که نوشیدن این نوع نوشیدنی‌ها کاملاً برای بدن مضر هستند حتی استفاده از بهترین برندهای انها ضررهای جبران ناپذیری برای بدن دارد ولی با این حال شاید یک عده به ناچار و به هر دلیلی علاقه مند و یا وابسته به استفاده از این مایع شده اند یا ترک کردن آن برای انها بسیار سخت می‌باشد لذا داشتن آگاهی از نحوه مصرف آن و همچنین کنترل کردن آن می‌تواند در کاهش صدمات استفاده از آن به مصرف کننده کمک کند مطالبی که در این نوشته ارائه می‌شود تماماً مبنای علمی دارد و برای صحت در انتهای فرننس‌ها به خواننده ارائه می‌شود خوب در این وشته ابتدا به معرفی کبد کارکرد و همچنین انواع بیماری‌های که ناشی از نوشیدن الكل در بدن ایجاد می‌شود می‌پردازیم و در نهایت یک دید کنترلی بر روی این ماده ارائه می‌دهیم تا مصرف کنندگان ان با توجه به میزان مصرف خود خطر را درک کنند و در جهت کاهش مصرف اقدام کنند.

۱.۲ کار کبد چیست؟

کبد در سمت راست و بالای شکم قراردارد که وظایف آن به شرح زیر است

- ✓ ذخیره سازی گلیکوژن که یک ماده شیمیایی است که در شکر موجود می‌باشد و در موقع نیاز گلیکوژن در کبد به گلوکوز شکسته می‌شود و وارد خون می‌گردد.
- ✓ کمک به فرایند جذب پروتئین و چربی در هضم غذا
- ✓ کمک به ساخت پروتئین برای فرایند انعقاد در خون
- ✓ تجزیه داروهای که مصرف می‌کنید
- ✓ کمک به دفع الكل سmom از بدن

✓ ساخت صفراء که از کبد به روده عبور می‌کند و باعث هضم چربی می‌شود



۱.۳ اتفاقاتی که هنگام نوشیدن الکل در کبد می‌افتد؟

هنگامی که شما الکل مصرف می‌کنید این الکل از طریق معده و روده جذب خون می‌شود تمام خونی که از مسیر معده و روده عبور می‌کند قبل از به گردش آمدن در کل بدن ابتدا از کبد عبور می‌کنند بنابراین یک جریان خون با غلظت بالای الکل از کبد عبور می‌کند آنزیم‌های موجود در کبد شروع به تجزیه و کار بر روی الکل می‌کنند آنزیم‌ها الکل را به مواد شیمیایی دیگر می‌شکنند که در نهایت به آب و دی‌اکسید کربن تبدیل می‌شوند سپس این مواد از طریق ادرار (آب) و یا شش‌ها (دی‌اکسید کربن) به بیرون دفع می‌شوند سلول‌های کبدی تنها تعداد محدودی از الکل را می‌توانند در هر ساعت تجزیه کنند بنابراین اگر شما با سرعتی بالاتر از کارکرد کبد الکل مصرف کنید میزان الکل در خون شما بالا می‌رود.

۱.۴ مشکلات ناشی از نوشیدن بیش از حد الکل

قبل از توصیف این مشکلات باید بگوییم که در ادامه ما خواهیم گفت منظور از نوشیدن بیش از حد چه مقدار می‌باشد و چه مقدار نوشیدن متعادل و چه مقدار کم است. بدن و کبد شما تنها می‌تواند با میزان اندکی الکل کنار بیاید از طرفی نوشیدن مقدار اندک الکل در روز می‌تواند به جلوگیری از بیماری‌های قلبی کمک کند (یک و یا دو واحد الکل در روز که در ادامه خواهیم گفت منظور از واحد الکل چیست) اما به هر حال نوشیدن الکل بیش از یک و یا دو واحد در روز باعث پیشرفت و یا ایجاد بیماری‌های زیر خواهد شد. این مواردی که در ادامه به ان‌ها اشاره می‌شود شاید درابتدا باعث ترس در شما شود که خوب یه قسمتیش درست ولی باید بگم که همه این موارد بستگی به شرایط بسیار زیادی از جمله نوع بدن هر شفیعه‌شترایط زندگی میزان سلامت زندگی یک فرد و مصرف دخانیات و سایر موارد دارد که در کنار آن‌ها بررسی شرایط زیر را می‌توان قرار داد در ادامه بعد از پایان علل به بررسی اینکه کدامیک می‌تواند برای شما اتفاق بی‌افتد و چه قدر شанс شما دران مورد زیاد است می‌پردازیم

۱. بیماری‌های جدی کبدی نظیر گبد چرب، هپاتیت و سیروز کبدی
۲. ناراحتی‌های معده
۳. مشکلات پانکراس
۴. مشکلات روحی مانند افسردگی و عصبانیت
۵. مشکلات جنسی نظیر عدم نفوذ در مردان
۶. بیماری قلبی
۷. فشار خون بالا
۸. چاقی
۹. برخی سرطان‌ها مانند گلو مری و سایر قسمت‌های گوارشی
۱۰. برای فرزندان زنان حامله
۱۱. و در نهایت الکلی شدن

خوب قبل از هر چیزی در مورد موارد بالا یکسری نکات را که می‌تواند به شما کمک کند را با توجه به نوع آن بیان می‌کنم که می‌تواند میزان خطر موارد بالا را برای شما کاهش دهد

۱.۴.۱ کبد چرب


در مورد گزینه شماره یک که کبد چرب و هاتیت و سیروز کبدی است باید بگوییم که در مرحله اول کبد چرب تنها مربوط به مصرف الکل نمی‌شود و حتی بیشتر در اثر مصرف فست فود‌ها و غذاهای چرب می‌باشد که سه گرید دارد و تقریباً تا گرید دو تنها از طریق رژیم و ورزش قابل درمان می‌باشد اما در گرید سه معمولاً از داروهای چربی سوز استفاده می‌شود که البته شیوه درمان به سن شما و شغل شما هم بستگی دارد در صورتیکه سن شما بالا باشد خوب به طبع سرعت متابولیسم بدن شما کاهش می‌باید و شما برای از بین بردن این چربی‌ها نیازمند رژیم سخت تر و ورزش بیشتری هستید که در صورت عدم ایجاد ان دکتر به شما فرص

چربی سوز می‌دهد

• علائم کبد چرب

کبد چرب جزو بیماری‌های خاموش هست که هیچ علائم ظاهری مشخصی ندارد مخصوصاً در مراحلی که در گرید دو می‌باشد لذا توصیه می‌شود هر شش ماه یک بار یه چکاپ کامل خون نه برای تنها کبد بلکه برای هزارن بیماری خاموش دیگر نظریر دیابت سرطان خون و... داده شود در مرحله اول کبد چرب دکتر از روی فعالیت آنزیم‌های شما متوجه می‌شود که ایا کبد شما در حال چرب شدن هست یا خیر و در صورتی که مشکوک به کبد چرب باشد برای شما یک سونوگرافی کبد می‌نویسد که بهترین روش تشخیص میزان چرب بودن کبد می‌باشد در کنار اسکن و روش‌های دیگر (فیبرو و نمونه برداری نیز از جمله این روش‌ها عستند که منتها در زمانی که بیماری بسیار پیشرفته است که مشکوک به کبد چرب باشد از این روش‌ها استفاده می‌شود) بعد از سونو مشخص می‌شود که میزان چربی کبد شما چه مقدار است و روش درمانی مناسب از سوی دکتر اتخاذ می‌شود که به نظر بنده و البته دکتر بنده بهترین روش رژیم و ورزش می‌باشد به طور یکه بنده در طول ۴ ماه از کبد چرب گرید دو تقریباً به هیچ رسیدم که در ادامه عکس مربوط به جواب ازمایش قبل و بعد را برایتان گذاشتهم (ورزش کردن را حتماً در برنامه روزانه خود بگذارید چرا که بسیار از بیماری‌ها را می‌توان از طریق تنها چند ساعت ورزش در هفته کنترل کرد میدونم سخته من خودم در ابتدا نمی‌تونستم اما باور کنید وقتی در برنامه تون قرار بگیره ترک کردنش سخته از طرفی من استادی داشتم می‌گفت اگر ترک کردن سیگار و یا مشروب یا هر چیز دگیری سخته و

نمی تونید ترکش کنید در عوض ورزش که می تونید به برنامه تون اضافه کنید همین ورزش اثر کمکی دارد فعالیت بدنی بسیار کمک می کند به جلوگیری از بسیاری از بیماری ها حتی اگر در زندگی خود دارای عادات بدی نظریه مصرف الکل و یا کشیدن سیگار هستید چه بسا کارگرانی را دیده اید که آبگوشت های با یه وجب چربی می خورند اما چون فعالیت بدنی بسیار بالایی دارند هیچ مشکلی ندارند)



شکل (۱.۱) نتیجه آزمایش مربوط به گبد چوب گورید دو در تاریخ ۱۳۹۲/۹/۱۲

در شکل فوق از بالا به پایین به ترتیب ابتدا تری گلیسرید را می بیند که دایره قرمز در آن مشخص شده است که مقدار آن ۳۰۰ بوده که در مقابل آن با فلش میزان متعادل و خطرناک آن نوشته شده است که در این مورد در رنج ریسک بالا قرار دارد(ابن آزمایش مربوط به ۱۳۹۲/۹/۱۲ می باشد)

دایره قرمز دوم مربوط به میزان کلسترول است که ۲۵۰ می باشد که باز از میزان ریسک بالا بالاتر است

دایره زرد و آخرين دایره مشخص کننده فعالیت آنزیم های کبدی می باشد که مهم ترین عامل در مرحله شناخت کبد را است که در اینجا هم می توان مشاهده کرد که میزان این آنزیم ها از حد مجاز بالاتر می باشد

در این مرحله دکتر دستور سونوگرافی می دهد یادتان باشد دستور سونو را تنها پژوهش متخصص گوارش می تواند بدهد که برای ازماپش بالا بعد از سونو کبد چرب گرید دو تشخیص داده شده است

در شکل زیر همین آزمایش را در تاریخ ۱۳۹۳/۱/۲۱ میتوانید بینید که سونو میزان چربی کبد را خفیف و کمتر از گرید یک نشان داده است

Test	Result	Units	Reference Range
Fasting Blood Sugar	78	mg/dl	70-115 Desirable <150
Triglycerides	149	mg/dl	Borderline 150-199 High Risk 200-499 Very High Risk >500
Cholesterol Total	200	mg/dl	Desirable <200 Borderline 200-239 High Risk >240
HDLcholesterol	50	mg/dl	Male : 30-70 Female : 30-85 < 130
LDL cholesterol	116	mg/dl	Women : Up to 31 Men : Up to 38
S.G.O.T (AST)	22	Iu/L	up to 41
S.G.P.T (ALT)	18	Iu/L	Child : 180 -1200 Adult: 80-360
Alkaline Phosphatase	215	Iu/L	LDL/HDL Ratio greater of increased risk of at
LDL/HDL Ratio	2.32		

شکل (۲.۱) نتیجه آزمایش مربوط به کبد گرید یک خفیف در تاریخ ۱۳۹۳/۱/۲۱

خوب همانند آزمایش قبلی دایره قرمز اول مربوط به میزان تری گلسرید است که از میزان ۳۰۰ در آزمایش اول به میزان ۱۴۹ کاهش یافته و در رنج مناسب قرار گرفته است

دایره سبز نشان دهنده میزان کلسترول است که از مقدار ۲۵۱ از آزمایش اول به میزان ۲۰۰ کاهش پیدا کرده است

و دایرہ زرد میزان فعالیت آنژیم های کبدی را نشان می دهد که از مقادیر ۳۵ و ۵۴ به مقادیر ۲۲ و ۱۸ کاهش یافته است

تمامی این تغییرات مربوط به رژیم و ورزش در تاریخ بین دو آزمایش می باشد

۱.۴.۲ ناراحتی معده

ناراحتی معده بر می گردد به چند دلیل بعضی از افراد به طور ژنی این مشکل معده را دارند و این مشکل با نوشیدن الكل تشدید می شود که این دوستان باید سعی کنند که مصرف الكل خود را کم کنند و یا د رهنگام مصرف الكل حتماً از مزه هایی که با معده انها سازگار است استفاده کنند دسته ای ای دیگر از افراد با معده تقریباً خالی اقدام به مصرف الكل می کنند که این امر موجب به زخم معده در انها می شود که معمولاً با درد شدید و بالا آوردن خون خود را نشان می دهد در کل پیشنهاد بنده این است برای جلوگیری از ناراحتی معده سعی کنید هرگز با شکم خالی اقدام به نوشیدن الكل نکنید و حتماً همراه با ان سعی کنید تا چیزهای دیگر را نیز میل کنید

۱.۴.۳ مشکلات روحی

خوب این یک چیز اجتناب ناپذیر که البته در مراحل بسیار حاد خود را نشان می دهد به طور یکه دیگر شخص به طور کامل وابسته به الكل شده باشد و لی در صورتیکه نوشیدن ان کنترل شده باشد صدمات روحی ان کمتر است البته تمامی این موارد به روحیه ذاتی خود شخص هم بستگی دارد به طوریکه برای اشخاصی که بیماری روحی به خصوصی دارند این حالت بیشتر اتفاق می افتد

۱.۴.۴ فشارخون و بیماری قلبی

اصولاً الكل خود یک ماده چربی سوز در بدن به حساب می اید به همین دلیل است که گفته شد مصرف یک تا دو واحد از آن می تواند در کاهش بیماری های قلبی مفید باشد اما خطر برای قلب از جایی شروع می شود که کبد شما چرب می شود و چون دیگر کبد کارایی خود را از دست می دهد چربی خون شما بالا خواهد رفت که در تصویر زیر به نمایش آمده است بالا رفتن چربی خون یا

کلسترول باعث مسدود شدن مجرای قلبی و افزایش ایست قلبی می‌شود که این باعث تغییرات فشار خون هم می‌شود لذا با جلوگیری از ایجاد کبد چرب باعث جلوگیری از ایجاد این حالت هم می‌شویم پس ورزش

۱.۴.۵ چاقی

افزایش اشتها پس از مصرف الكل ممکن است در بسیار از افراد اتفاق بی افتد که خوب دلایل زیادی دارد اما برای ان دسته از افراد که این حالت برایشان رخ می‌دهد باید مراقب غذایی که پس از مصرف الكل استفاده می‌کنند باشند زیرا در این موقع کبد ظرفیت تجزیه چربی بیشتر را ندارد و خوردن غذاهایی با چربی بالا احتمال انباشت چربی و افزایش وزن را بالا می‌برد سعی کنید همراه با مصرف الكل از بادام و یا غذاهایی با چربی خوب و خاصیت سیر کنندگی استفاده کنید تا مجبور به استفاده از غذاهای پر حجم برای سیر کردن خود نباشید

در این قسمت تنها به بررسی چندی از عوامل ناشی از خوردن الكل پرداختیم و راه حل‌هایی را برای مقابله با انها ارائه کردیم اما این راه حل‌ها کلی می‌باشد و سعی کنید بدن خود را بشناسید تا رفتار درستی در مواجهه با مشکلات ان داشته باشید

در ادامه به بررسی بیشتر انواع بیماری‌های کبدی ناشی از مصرف الكل می‌پردازیم و راه‌های مقابله با آن را بررسی می‌کنیم

۱.۵ انواع بیماری‌های کبدی

نوشیدن زیاد الكل می‌تواند به سه نوع بیماری کبد چرب هپاتیت و سیروز کبدی منجر شود که در ادامه به بررسی تک تک این موارد می‌پردازیم

۱.۵.۱ کبد چرب

کبد چرب خود به طور خاص بیماری خیلی خطرناکی نیست و در صورتی که نوشیدن بیش از حد الکل متوقف شود قابل بازگشت می‌باشد. دارای دو نوع الکلی و غیر الکلی هست کبد چرب در صورتی که پیشرفت کند باعث ایجاد هپاتیت الکلی می‌شود که خطرناک می‌باشد.

۱.۵.۲ هپاتیت الکلی

هپاتیت الکلی کبد به معنی التهاب کبد می‌باشد که این التهاب از مقدار متوسط تا زیاد می‌تواند ایجاد مشکل کند.

- ✓ التهاب متوسط هیچ نشانه خارجی ندارد تنها این نوع التهاب ممکن است از طریق فعالیت بیش از حد آنزیمهای کبدی در ازمایش خون مشخص می‌شود به هر حال التهاب کبد در صورتی که برای مدت طولانی ادامه داشته باشد می‌تواند به تدریج باعث صدمه زدن به کبد و همچنین منجر به سیروز کبدی گردد.
- ✓ التهاب زیاد کبد باعث ایجاد نشانه‌هایی همچون درد در کبد، بی‌حالی یرقان زردی پوست می‌شود
- ✓ التهاب خیلی زیاد کبد باعث زردی سریع، عدم انعقاد خون کما و در نهایت مرگ شود

اصلی‌ترین درمان برای التهاب کبد مربوط به تغذیه و همچنین استفاده از استروئید‌ها می‌شود

۱.۵.۳ سیروز کبدی

این حالت مربوط به شرایطی می‌شود که طی آن کبد از حالت طبیعی خارج شده و به حالت خرابی پیش می‌رود در این مرحله رشد سلول‌های کبدی دچار اختلال می‌شود این بیماری در این مرحله به تدریج باعث از بین رفتن سلوهای کبدی می‌شود که بر روی عملکرد کبد در تصفیه خون اثر می‌گذارد که حتی باعث برگشت خون به کبد گردد. در بین هر ۱۰ نفر فردی که نوشیدن الکل را به شدت زیاد ادامه می‌دهند یک نفر در نهایت مبتلا به سیروز کبدی می‌شود مدت زمان ابتلا به این بیماری در صورتی که فرد به مدت ده سال به شدت به نوشیدن مشروبات الکلی مبادرت ورزد به این مرحله از بیماری کبدی می‌رسد ضمناً سیروز کبدی ممکن است حتی در اشخاصی هپاتیت الکلی نیز ندارند اتفاق بی‌افتد.

مشخص نیست که چرا برخی افراد استعداد بیشتری در تخریب کبد و ایجاد سیروز کبدی ناشی از نوشیدن الکل دارند اما هر چه میزان الکل و مدت زمان مصرف آن بیشتر باشد سریع‌تر کبد دچار تخریب می‌گردد. سیروز کبدی همانند التهاب کبد و چربی قابل برگشت نیست

۱.۶ راههای درمان برای بیماری‌های الکلی کبد

برای تمامی سه نوع بیماری که در بالا گفته شده در صورت بروز نشانه و متوجه شدن بیمار باید سریعاً نوشیدن الکل را متوقف کند و یک برنامه غذایی مناسب را بر گزیند.

اگر شما دچار کبد چرب هستید و یا هپاتیت کبد خیلی پیشرفته نباشد با توقف نوشیدن الکل امکان بازگشت وجود دارد

۱.۷ پیشگیری از بیماری کبدی الکلی

در صورتیکه شما در محدوده مشخص شده به مصرف الکل بپردازید امکان ابتلا به این بیماری‌ها کاهش می‌یابد و یا به کل از بین می‌رود.

مردها نباید بیش از ۲۱ واحد الکل در طول هفته مصرف کنند و یا مصرف کمتر از ۴ واحد یک روز در میان حداقل ۴۸ ساعت در هفته باید از مصرف الکل خودداری کنند.

زنان نباید بیش از ۱۴ واحد الکل در هفته مصرف کنند و یا کمتر از ۳ واحد یک روز در میان حداقل ۴۸ ساعت در هفته باید از مصرف الکل خودداری کنند.

حال اینکه این مقادیر توصیه شده بر جه اساسی می‌باشد در ادامه به آن خواهیم پرداخت

سازمان بهداشتی^۱ امریکا پیشنهاد می‌کند که مردان نباید بیش از ۴ واحد الکل در روز و خانم‌ها بیش از ۳ واحد به طور منظم مصرف کنند به طور منظم یعنی یک روز در میان و یا چندین روز در هفته و اگر به طور یک روز در میان بیش از حد مصرفی تعیین شده مصرف کردند باید حتماً ۴۸ ساعت از نوشیدن الکل خودداری کنند تا بدن بتواند خود را بازیابی کند.

کالج بیزشکان رویال^۲ نیز در این زمینه ۲۱ واحد برای مردان و ۱۴ واحد برای زنان در هفته را توصیه می‌کند این سازمان توصیه می‌کند که علاوه بر میزان مجاز الکل باید به مدت زمان استفاده از آن طول هفته نیز توجه کرد به طوریکه افرادی که روزانه و یا تقریباً روزانه به مصرف الکل می‌پردازند در مقایسه با کسانی که بازه‌های زمانی طولانی تری از الکل استفاده می‌کنند بیشتر در معرض خطر بیماری کبدی هستند

سازمان علوم رایج و کمیته فناوری^۳ پیشنهاد می‌کند تا افراد حتماً دو روز بدون مصرف الکل در هفته در نظر بگیرند بعضی‌ها بر این اعتقادن که میزان مشخص شده برای مصرف الکل در روز بسیار بالا می‌باشد و مقدار بیش از ۲ واحد در روز برای مردان و یک واحد برای زنان می‌تواند میزان سرطان را در افراد افزایش دهد.

نکته مهم دیگری که باید به یاد داشته باشید این است که در صورتیکه در طول هفته تنها یک روز به نوشیدن الکل مبادرت بورزید اما در همان یک نوبت مقدار زیادی الکل مصرف کنید خطر ابتلا به بیماری کبدی را افزایش می‌دهد برای مثال نوشیدن ۲ یا ۳ لیتر آبجو در یک نوبت و یا نوشیدن یک بطری شراب می‌تواند خطرناک باشد.

هر یک واحد الکل شامل ۱۰ میلی لیتر الکل (۱ سی سی) و یا ۸ گرم الکل خالص می‌باشد که معادل نوشیدنی‌های زیر است

- ✓ یک چهارم لیتر آب جو ۳ تا ۴ درصد
- ✓ یک پیاله کوچک معادل ۲۵ میلی لیتر از ودکا ۴۰ درصد
- ✓ و میزان ۵۰ میلی لیتر از شراب ۲۰ درصد

همچنینی میزان یک و نیم واحد الكل می‌تواند شامل

✓ ۱۲۵ میلی لیتر الكل ۱۲ درصد

✓ و ۳۵ میلی لیتر الكل ۴۰ درصد

باید توجه داشته باشید که بعضی از ابجوها و شراب‌ها بسیار قوی تر از درصد الكل ذکر شده برروی آن‌ها می‌باشد که برای اینکه بتوان مقدار دقیق تری را بدست آورد می‌توان از میزان الكل در حجم استفاده کرد برای مثال میزان الكل در حجم مشخصی از یک نوشیدنی برابر است با تعداد واحدهای الكل در یک لیتر از آن نوشیدنی مثلاً

✓ برای مثال آب جوهای قوی با میزان abv%۶ دارای ۶ واحد الكل در یک لیتر از این آبجو می‌باشد.

✓ شراب با میزان abv%۱۴ دارای ۱۴ واحد الكل در یک لیتر می‌باشد.

بنابراین ممکن به نظرتون یک اجو بخورید که گیرایش از عرق سگی هم بیشتر باشد که به همیتن دلیل یعنی افزایش واحدهای الكل در حجم مشخصی از آن است.

در پایان باید این نکته را متذکر شد که به هر حال مصرف الكل مضرات خود را دارد اما این مقاله بیشتر برای کسانی است با توجه به این مضرات همچنان علاقه دارد تا لذت خوردن این اشک چشم و جوهر را ببرند و به قول معروف بی میناب زیستن را نتوانند

۱.۸ پاورقی

در پایان اگر در این مورد مشکل و یا سئوالی بود می‌توانید از طریق آدرس وبلاگ آمده در هدر هر صفحه به بنده منتقل کنید از این نام و وبلاگ سه گتاب دیگر به نام‌های زیر منتشر شده ابسطیکه و بلگاتمشیما تواند مرا در تدوین نوشتنهای بعدی راهنمایی کند

[کتاب بهترین های وندوز ۱](#)

[کتاب حاذه های استان سمنان](#)

[کتاب آموزش وندوزفون](#)

کتاب ها را می توانید در ادرس زیر پیدا کنید

[مسعود-سیاوش](http://ketabesabz.com/authors/2331/)

با تشکر

م. سیاوش

۱.۹ مراجع

<http://www.patient.co.uk/health/alcohol-and-liver-disease>

البته مراجع کلی دیگری هم بود ۵ که مربوط به مطالعات شخصی در این زمینه از اینترنت می شود که از ارائه آنها صرفنظر شده

است



در کanal تلگرام کارنیل هر روز انگیزه خود را شارژ کنید ☺

<https://telegram.me/karnil>

